

Nimi, vahvuus ja lääkekuoto

FINASTERID C.R.I.D.

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Yksi tabletti sisältää:

Vaikuttava aine: Finasteridi 5 mg
Apuaineet: Laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, dokusaattinatrium, magnesiumstearaatti, talkki, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), hypromelloosi, propyleeniglykoli, titaanidioksidi (E171), indigotiini (E132, sininen väriaine).

Myyntiluvan haltija:

C.R.I.D. Pharma, 17, parc de Vautes, F-34983 Saint Gely Du Fesc, Ranska

Valmistaja:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Barleben, Saksa
HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska

Lisätietoja antaa:

OY HEXAL AB, Rajatorpantie 41, 01640 Vantaa

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti läpi, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

Huomaa, että lääkäri on voinut määrätä tätä lääkettä muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai toisella annostuksella kuin tässä pakkausselosteessa on mainittu. Noudata aina lääkärin määräystä ja lääkepakkauksen ohjelippuun merkittyjä ohjeita.

1. Mitä Finasterid C.R.I.D. on ja mihin sitä käytetään?

Finasterid C.R.I.D. kuuluu lääkeryhmään nimeltä 5-alfareduktaasin estäjät.

Finasterid C.R.I.D. vaikuttaa estämällä mieshormoni testosteronia dihydrotestosteroniksi muuttavan entsyymin toimintaa. Tämän seurauksena eturauhasen kasvusta ja suurenemisesta vastaavan dihydrotestosteronin määrä vähenee.

Finasterid C.R.I.D.in käyttötarkoitukset ovat:

- eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito ja pysäyttäminen
- virtsaamiskyvyttömyyden riskin pienentäminen ja leikkaushoidon tarpeen vähentäminen.

2. Ennen kuin käytät Finasterid C.R.I.D.ia

Älä käytä Finasterid C.R.I.D.ia

- jos olet allerginen jollekin valmisteen aineosalle
- jos olet nainen. Valmistetta ei myöskään saa antaa lapsille.

Ole erityisen varovainen Finasterid C.R.I.D.in suhteen

Eturauhassyövän mahdollisuuden poissulkemiseksi lääkärisi saattaa tehdä joitakin kokeita ennen Finasterid C.R.I.D. -hoidon aloittamista.

Finasteridi estää dihydrotestosteronia, joka vaikuttaa poikasikiöiden sukupuoliseen kehitykseen. Siksi finasteridihoitoa saavien miesten on käytettävä kondomia ollessaan yhdynnässä raskaana tai hedelmällisessä iässä olevan naisen kanssa, koska siemennesteessä on pieniä määriä finasteridia.

Naiset, jotka ovat raskaana tai saattavat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä murskattuja tai rikkottuja Finasterid C.R.I.D.-tabletteja, koska ne voivat vaikuttaa haitallisesti poikasikiöiden sukupuolielinten kehitykseen.

Raskaus ja imetys

Finasterid C.R.I.D. ei ole tarkoitettu naisille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Finasterid C.R.I.D. ei tiedettävästi vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Muiden lääkkeiden käyttö

Finasterid C.R.I.D. ei yleensä haittaa muiden lääkkeiden käyttöä. Kysy kuitenkin aina neuvoa lääkäriltä, ennen kuin käytät muita lääkkeitä samanaikaisesti Finasterid C.R.I.D.in kanssa.

3. Miten Finasterid C.R.I.D.ia käytetään?

Aikuiset:

1 tabletti kerran päivässä joko ruokailun yhteydessä tai muuna ajankohtana.

Nauti lääkkeen kanssa iso lasillinen vettä.

Jotta oireesi lievittyisivät ja sairautesi saataisiin tehokkaasti hallintaan, on tärkeää, että jatkat Finasterid C.R.I.D.in käyttöä niin pitkään kuin lääkäri määrää, vaikka et heti huomaisi hyötyväsi lääkkeestä.

Joillakin potilailla oireet lievittyvät nopeasti, mutta saatat joutua käyttämään Finasterid C.R.I.D.ia ainakin kuuden kuukauden ajan, ennen kuin selviää, onko siitä apua Sinulle.

Jos otat liikaa Finasterid C.R.I.D.ia

Jos olet ottanut liikaa Finasterid C.R.I.D.ia, ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Finasterid C.R.I.D.ia

Jos unohdat ottaa Finasterid C.R.I.D.ia, ota lääke heti kun muistat - Älä ota kaksinkertaista annosta.

4. Haittavaikutukset

Finasterid C.R.I.D.-hoidon aikana saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Joillakin miehillä voi ilmetä seksielämään liittyviä muutoksia kuten yhdyntäkyvyttömyyttä, sukupuolisen halun heikkenemistä ja kertasiemennesteen määrän vähenemistä. Nämä haittavaikutukset häviävät yleensä hoitoa jatkettaessa.

Lisäksi voi esiintyä rintojen suurenemista ja/tai arkuutta sekä harvinaisissa tapauksissa yliherkkyysoireita (allergisia reaktioita) kuten ihon kutinaa, ihottumaa ja huulten turpoamista.

Jos Sinulle tulee häiritseviä tai epätavallisia oireita, joiden epäilet voivan johtua Finasterid C.R.I.D.ista, ota yhteyttä lääkäriin.

5. Finasterid C.R.I.D.in säilyttäminen

Ei lasten ulottuville.

Säilytä alle 25 C.

Älä käytä Finasterid C.R.I.D.ia pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

C.R.I.D. PHARMA

Pakkausseloste tarkistettu viimeksi 24/03/2004

Namn, styrka och läkemedelsform

FINASTERID C.R.I.D.
5 mg filmdragerade tabletter

En tablett innehåller:

Verksamt ämne:

Finasterid 5 mg

Övriga ämnen:

Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, povidon, dokusatnatrium, magnesiumstearat, talk, natriumstärkelseglykolat (typ A), hypromellos, propylenglykol, titandioxid (E171), indigotin (E132, blå färg).

Innehavare av försäljningstillstånd:

C.R.I.D. Pharma, 17, parc des Vautes, F-34983 Saint Gely Du Fesc, Ranska

Tilverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Barleben, Tyskland*

HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Danmark**

*(Will only be mentioned if Salutas is the manufacturer)

** (Will only be mentioned if HEXAL A/S is the manufacturer)

Information lämnas av: OY HEXAL AB, Råtorpsvägen 41, 01640 Vanda

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda medicinen.

Observera att din läkare kan ha ordinerat denna medicin för annat ändamål och/eller i en annan dosering än vad som anges i bipacksedeln. Du ska alltid följa läkarens ordination och de anvisningar som finns på förpackningens etikett.

1. Vad är Finasterid C.R.I.D. och vad används det för?

Finasterid C.R.I.D. tillhör en läkemedelsgrupp kallad 5-alfareduktashämmare.

Finasterid C.R.I.D. utövar effekt genom att hämma aktiviteten hos det enzym som omvandlar manligt könshormon, testosteron, till dihydrotestosteron. Tack vare detta minskar mängden dihydrotestosteron som svarar för tillväxt och förstoring av prostatakörteln.

Indikationer för Finasterid C.R.I.D.:

- att behandla och hämma godartad förstoring av prostatakörteln (prostatahyperplasi)
- att minska risken för hämrat urinflöde (urinretention) och behovet av operativ behandling.

2. Innan du använder Finasterid C.R.I.D.

Använd inte Finasterid C.R.I.D.

- om du är allergisk för någon beståndsdel i preparatet
- om du är kvinna. Preparatet får inte heller ges till barn.

Var speciellt försiktig vid användning av Finasterid C.R.I.D.

För att utesluta att du inte har prostatacancer vill din läkare kanske ta vissa prov innan behandling med Finasterid C.R.I.D. inleds.

Finasterid hämmar dihydrostestosteron som påverkar den sexuella utvecklingen hos foster av manligt kön. Män som behandlas med finasterid måste använda kondom under samlag med gravida kvinnor/kvinnor i fertil ålder eftersom sädesvätskan innehåller små mängder finasterid. Kvinnor som är gravida eller kan tänkas bli gravida får inte hantera krossade eller sönderdelade Finasterid C.R.I.D. tabletter eftersom dessa skadligt kan påverka utvecklingen av könsorganen hos foster av manligt kön.

Graviditet och amning

Finasterid C.R.I.D. är inte avsett för kvinnor.

Framförande av fordon och användning av maskiner

Finasterid C.R.I.D. har ingen känd inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Vid intag av andra läkemedel

Finasterid C.R.I.D. stör vanligen inte användningen av andra läkemedel. Du skall emellertid alltid konsultera din läkare innan du använder andra läkemedel samtidigt som Finasterid C.R.I.D.

3. Hur ska Finasterid C.R.I.D. användas?

Vuxna:

1 tablett dagligen antingen i anslutning till måltid eller vid någon annan tidpunkt.

Drick ett stort glas vatten tillsammans med din medicin.

För att dina symtom skall lindras och din sjukdom effektivt skall kunna behärskas är det viktigt att du fortsätter att medicinera med Finasterid C.R.I.D. under hela den tid din läkare ordinerat detta även om du inte genast märker att du har nytta av läkemedlet.

Hos vissa patienter lindras symtomen snabbt men du kan behöva använda Finasterid C.R.I.D. under minst 6 månader innan det framgår om du har nytta av behandlingen.

Om du tar för mycket Finasterid C.R.I.D.

Om du har tagit för mycket Finasterid C.R.I.D. skall du kontakta din läkare eller ett sjukhus.

Om du glömmer att ta Finasterid C.R.I.D.

Om du glömmer att ta Finasterid C.R.I.D. skall du ta den glömda dosen så fort som möjligt - tag inte dubbel dos.

4. Biverkningar

Följande biverkningar kan utvecklas under behandling med Finasterid C.R.I.D.:

Vissa män kan utveckla förändringar relaterade till sexuallivet såsom impotens, minskad sexuell lust och minskad mängd ejakulat. Dessa biverkningar avklingar vanligen under fortsatt behandling.

Dessutom kan bröstförstoring och/eller bröstömhet förekomma samt i sällsynta fall överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) såsom klåda i huden, hudutslag och läppsvullnad.

Om du utvecklar störande eller ovanliga symtom som du misstänker orsakas av Finasterid C.R.I.D. skall du konsultera din läkare.

5. Hur skall Finasterid C.R.I.D. förvaras?

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras vid högst 25° C.

Använd inte Finasterid C.R.I.D. efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.